

Гербіцид Голд Стар - Гранстар



Луцьк, Україна

Голд Стар - післясходовий гербіцид системної дії для контролю дводольних бур'янів, у тому числі види стійкі до 2, 4-Д в посівах зернових колосових культур.

Склад: трибенурон-метил, 750 г/кг. Тара: 0,05 кг.

Застосовується в період вегетації з додаванням прилипача:

- Зернові колосові – норма 20-25 г/га, обприскування посівів від фази 3 листків до появи прапорцевого листа культури включно.
- Соняшник (гібриди, стійкі до трибенурон-метилу в залежності від стійкості) – норма 30/50 г/га, обприскування посівів у фазі 2–8 листків у культури; для запобігання пригнічення соняшника одноразове внесення трибенурон-метилів не повинно перевищувати 30 г/га.

Особливості внесення.

- Препарат застосовується з додаванням прилипача.
- Найефективніший період для застосування - від 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури.
- Оптимальна температура повітря від 15 до 25°C. Обробка при нижчих температурах не впливає на ефективність дії препарату.
- НЕ рекомендується робити бакові суміші з препаратами із групи фосфорорганічних сполук.
- НЕ змішувати із грамініцидами у посівах соняшнику. Інтервал між обробками в таких випадках повинен становити не менше 10 діб.

Практика застосування.

- Для обробки озимої пшениці проти однорічних злакових (метлюг, мишій (види), лисохвіст, просо куряче (плоскуха) та дводольних бур'янів вносять до середини фази куціння зернових бакову суміш: гербіцид Панда (пендиметалін, 330 г/л) 2, 5 л/га + гербіцид Голд Стар 15 грам/га.

- Для розширення спектру дії при значному забур'яненні зернових амброзією, нетребою, суріпицею у бакову суміш до трибенурон-метилу додають гербіцид Агент: 0, 3-0, 4 л/га Агент + 15 грам/га Голд Стар.

Важливо: при внесенні гербіцидів режим змішування обприскувача має бути постійно ввімкненим; для підвищення ефективності дії пестицидів використовуйте прилипачі.

Price: **52 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Адміністратор ТОВ "А+Сервіс"

098-245-57-51

Україна