

Гербицид Селефіт - Гезагард



Луцьк, Україна

Селефіт - досходовий гербицид широкого спектру дії проти однорічних дводольних та деяких злакових бур'янів.

Склад: прометрин, 500 г/л. Тара: 5/20л. Період захисної дії: 5-7 неділь.

Застосування. Обприскування ґрунту до або після посіву, але до появи сходів культури:

- Картопля, соя – 3, 0-4, 0 л/га;
- Соняшник – 2, 0-4, 0 л/га;
- Горох - 3, 0-5, 0 л/га;
- Морква - 2, 0-3, 0 л/га (також після сходів культури у фазі 1-2 справжніх листки);
- Коріандр (кріп, петрушка, селера) – 3, 0-4, 0 л/га (також після сходів культури у фазі 1-3 справжніх листки).

Норми витрат робочого розчину – 200-300 л/га; обробок – 1.

Особливості застосування.

- Обробку проводять свіжеприготовленим робочим розчином за температури 10-25°C.
- За відсутності вологи рекомендується неглибока заробка в ґрунт.
- Після внесення гербициду не рекомендується проводити міжрядну обробку - це зменшить його ефективність.
- При змішуванні з препаратом на основі ацетохлору або пропізохлору, співвідношення має складати 1:1, а по ацетохлору не перевищувати 2, 0 л/га.

Спектр дії.

Дводольні бур'яни: галінсога дрібноквіткова, гірчиця (види) та редька дика (краще знищуються у фазі сходів), грицики звичайні, зірочник середній, портулак городній, роман польовий, фіалка польова, щиріця (види), курячі очка польові, лобода (види), льонок малий, королиця посівна, дурман звичайний, герань розсічна, геліотроп європейський, гірчак (види), паслін чорний, шпергель звичайний, осот городній та рожевий (з насіння), кропива жалка, вероніка персидська, нетреба звичайна та колюча, переліска однорічна, буркун лікарський, ромашка (види), кучерявець Софії.

Злакові бур'яни: елевзіна індійська, тонконіг однорічний та звичайний.

Важливо: при внесенні гербицидів режим змішування обприскувача має бути постійно ввімкненим; для підвищення ефективності дії пестицидів використовуйте прилипачі.

Price: **7.50 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Адміністратор ТОВ "А+Сервіс"

098-245-57-51

Україна