

## Фунгіцид для бобових, зернових Дезарал Екстра



Луцьк, Україна

Дезарал Екстра – системний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії для захисту посівів від широкого спектру хвороб.  
Склад: карбендазим, 250 г/л + флутриафол, 150 г/л. Тара: 5/20 л.

Застосовується в період вегетації профілактично або за перших ознак прояву хвороби:

- Зернові-колосові 0, 6-1, 0 л/га /борошнеста роса, септоріоз, іржа, гельмінтоспоріоз, церкоспорельозна коренева гниль/;
- Горох 0, 6-0, 8 л/га /фузаріозна коренева гниль, антракноз, борошнеста роса, склеротиніоз/;
- Соняшник 0, 8-1, 0 л/га /фомоз, фомопсидоз, альтернаріоз, іржа, борошнеста роса, септоріоз, склеротиніоз/.

Практика застосування аналогічного препарату:

- Буряк цукровий 0, 6-0, 8 л/га /альтернаріоз, борошнеста роса, церкоспороз/;
- Соя 0, 8 л/га /антракноз, іржа, септоріоз, борошнеста роса/;
- Ріпак 0, 6-0, 8 л/га /фомоз, склеротиніоз, альтернаріоз, циліндроспоріоз, борошнеста роса/;
- Рис 0, 8-1, 0 л/га /перікуляріоз/.

Особливості застосування.

Внесення фунгіциду по соняшнику та ріпаку слід починати при 3-4 листках культур, а для захисту посівів сої - від фази 1 трійчатого листа, що є дуже важливим, зокрема, для профілактики фомозу та фомопсису.

При проявах пероноспорозу/несправжня борошнеста роса /жовтувато-зелені плями округлої форми на листі та сірувато-фіолетовий пушок під листом, що з'являються зазвичай в період масового цвітіння культур/ посіви обприскують препаратами, що мають у своєму складі цимоксаніл (Захист 0, 5-0, 8 кг/га) або азоксистробін та ципроконазол (Капітал 0, 7-1, 2 л/га).

Максимально бробок – 2. Період очікування до збору врожаю – 30 діб. Норма витрати робочого розчину: 200-300 л/га.

Важливо: при внесенні фунгіциду режим змішування обприскувача має бути постійно ввімкненим; для підвищення ефективності дії пестицидів використовуйте прилипачі.

Price: **13 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Адміністратор ТОВ "А+Сервіс"

098-245-57-51

Украина