

Гербіцид Мастак - Лонтрел



Луцьк, Україна

Мастак / Лонтрел - післясходовий гербіцид системної дії для знищення багаторічних дводольних бур'янів.

Склад: клопіралід, 300 г/л. Тара: 5л.

Застосування.

- Буряк цукровий (0, 35 л/га), обприскування у фазі 1-3 пар справжніх листків культури.
- Злакові газонні трави (0, 35 л/га), обприскування у фазі кущіння культури.
- Полуниця, капуста (0, 3 л/га), обприскування після висаджування розсади або після збору ягід.

Світовий досвід застосування:

- Жито (0, 3 л/га), обприскування від фази кущіння до початку виходу в трубку культури.
- Пшениця, просо, овес, ячмінь (0, 3-0, 6 л/га), обприскування від фази кущіння до початку виходу в трубку культури.
- Ріпак ярий та озимий (0, 3-0, 5 л/га), обприскування у фазі 2-4 листки у однорічних бур'янів та у фазі «розетки» у осотів.
- Льон-довгунць на технічні цілі (0, 3 л/га), обприскування у фазі «ялинки» культури.
- Кукурудза на зерно (0, 8-1, 0 л/га), обприскування у фазі 3-5 справжніх листків культури.

Обробка: 1. Витрати робочого розчину: 150-250 л/га.

Особливості внесення.

- Найвищий рівень ефективності досягається при обробці посівів у ранні фази розвитку бур'янів – 2-4 листочки.
- Обробку необхідно проводити в безвітряну суху погоду за температури 10-25°C.
- Обробка при низьких температурах не впливає на ефективність дії препарату.
- Опади, які випали через 6 години після внесення гербіциду не впливають на його ефективність.

Спектр дії: буркун (види), волошка синя, молоко татарський, осот (види), будяк, кульбаба лікарська, паслін чорний, ромашка (види), цикорій дикий, молочай лозяний, інші бур'яни з родини айстрових, губоцвітих, пасльонових, гречкових.

Високоєфективний у знищенні падалиці соняшнику.

Важливо: при внесенні гербіцидів режим змішування обприскувача має бути постійно ввімкненим; для підвищення ефективності дії пестицидів використовуйте прилипачі.

Price: **27 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: доречний

Адміністратор ТОВ "А+Сервіс"

098-245-57-51

Україна