

## Гербицид для цибулі Макстар - Старане



Луцьк, Україна

Макстар / Старане - післясходовий системний гербицид вибіркової дії проти однорічних та деяких багаторічних дводольних бур'янів, (в т.ч. стійких до 2, 4-Д та 2М-4Х) у посівах сільськогосподарських культур.

Склад: флуроксіпір-мептил, 250 г/л.

Застосування:

- Зернові колосові (0, 5 – 0, 7 л/га), обприскування від фази куціння до прапорцевого листка;
- Мак (0, 5 – 0, 7 л/га), обприскування у фазі 4-6 справжніх листків культури;
- Цибуля (0, 5 - 0, 7 л/га), обприскування у фазі 1-2 справжніх листків культури;
- Кукурудза (0, 7 - 0, 8 л/га), обприскування у фазі 3-5 справжніх листків культури.

Обробок: 1. Витрати робочого розчину: 150-250 л/га.

Особливості внесення.

- Обробку проводити у безвітряну суху погоду при температурі 10-25°C за 6 годин до опадів.
- Найвища ефективність досягається при обробці посівів у ранні фази розвитку бур'янів.
- Не застосовувати препарат у посівах культурних рослин, що перебувають в стресовому стані (під час посухи, надмірного зволоження ґрунту, пошкодження шкідниками, хворобами, приморозками тощо) та при різких перепадах нічних і денних температур.

Спектр дії.

Чутливі бур'яни: берізка польова, гірчак березковидний, гірчак земноводний, жабрій звичайний, зірочник середній, калачики непомітні, калачики лісові, курячі очка польові, підмаренник чіпкий, спориш звичайний, щавель горобиний, щавель кучерявий, щавель туполистий.

Середньочутливі бур'яни: дурман звичайний, незабудка польова, паслін чорний, кохія вінична, грицики звичайні, приворотень польовий, гусимець Талья, полин звичайний, кропива глуха стеблообгортаюча, кропива глуха пурпурна, гірчиця польова, хвощ польовий, ромашка (види).

Важливо: при внесенні гербицидів режим змішування обприскувача має бути постійно ввімкненим; для підвищення ефективності дії пестицидів використовуйте прилипачі.

Price: **23.50 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Адміністратор ТОВ "А+Сервіс"

098-245-57-51

Україна