

Фунгіцид Джек Пот - Топаз Плюс



Луцьк, Україна

Джек Пот - системний фунгіцид профілактичної, лікувальної та викорінюючої дії.

Витрати на 1 га: 300 - 600 грн.

Склад: пенконазол 100 г/л, дифеноконазол 200 г/л. Тара: 1/5 л.

Застосування.

- Яблуня – 0, 3-0, 4 л/га (борошниста роса, парша, альтернаріоз), строк очікування –20 діб. Обробок 1-3.
 - Абрикос – 0, 4-0, 5 л/га (борошниста роса, парша, кучерявість листя, гниль плодів, альтернаріоз), строк очікування –30 діб. Обробок 1-3.
 - Персик – 0, 4-0, 5 л/га (борошниста роса, парша, кучерявість листя, гниль плодів, альтернаріоз), строк очікування –3 діб. Обробок 1-2.
 - Огірки відкритого / закритого ґрунту та інші гарбузові – 0, 20-0, 25 л/га (борошниста роса, альтернаріоз), строк очікування –14 діб. Обробок 1-2.
 - Виноград – 0, 25-0, 4 л/га (оїдіум, чорна плямистість), строк очікування –30 діб. Обробок 1-4.
- Норма витрати робочого розчину: виноградники—500-800 л/га, плодіві—500-1000 л/га, огірки відкритого ґрунту—200-300 л/га, огірки закритого ґрунту-1000-1200 л/га.

Особливості застосування.

- Не змішувати з препаратами на основі міді.
- Оптимальна фаза застосування фунгіциду – профілактично, на початку вегетації.
- Додаткові обробки проводяться для запобігання поширення хвороби чи при появі перших ознак хвороби з інтервалом між ними 10-14 діб, залежно від розвитку хвороби та погодних умов.
- При високому ризику розвитку хвороби інтервали між обробками скорочують до 10 днів. За сезон проводять 2-4 обприскування в основний період розвитку борошнистої роси, який починається в період цвітіння культури та продовжується до стадії дозрівання плодів.
- Джек Пот бажано використовувати для лікування - не пізніше 2-4 діб з моменту початку ураження.

Важливо: при внесенні фунгіциду режим змішування обприскувача має бути постійно ввімкненим; для підвищення ефективності дії пестицидів використовуйте прилипачі.

Price: **42 \$**

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Адміністратор ТОВ "А+Сервіс"

098-245-57-51

Україна